

Віваліс відповідає за реалізацію політики охорони здоров'я та допомоги населенню в регіоні Брюсселя. Віваліс є адміністрацією Об'єднаної громади комісії.

Кір



- Кір – це висококонтагіозна вірусна інфекція, що передається повітряно-крапельним шляхом.
- Діти віком до 10 років мають найвищий ризик захворювання.
- 30% інфікованих мають ризик ускладнень. Можливі приклади включають інфекції вух, легеневі інфекції або більш серйозні ускладнення, які можуть призвести до госпіталізації.

Симптоми

Кір характеризується лихоманкою і червоною плямистою висипкою (червоні плями на шкірі). Можуть також бути присутніми інші, менш специфічні симптоми: кашель, симптоми застуди, кон'юнктивіт.



Що робити, якщо у вас є симптоми?

Якщо у вашої дитини або у когось з вашого оточення з'являються симптоми або якщо ви сумніваєтеся:

- Зверніться до вашого лікаря загальної практики ПЕРЕД тим, як піти на консультацію.
- Уникайте контакту між людиною з симптомами і людьми, які не були вакциновані або є вразливими (немовлята, вагітні жінки тощо).
- Не дозволяйте вашій дитині відновлювати діяльність або повертатися до дитячого садка, поки ваш лікар не дозволить це зробити.
- Носіть маску (як ви, так і ваша дитина) під час консультації.



Хто знаходиться в групі ризику ускладнень?

Особи, які мають найвищий ризик ускладнень від кору, це:


- неімунізовані особи (ті, хто ніколи не був вакцинований проти кору або хто ніколи ним не хворів)
- люди з ослабленим імунітетом або ті, у кого імунна система ослаблена
- вагітні жінки
- немовлята (діти до 12 місяців)



Вакцинація = захист

Вакцинація двома дозами вакцини КПК (кір-краснуха-паротит) є єдиним ефективним захистом від захворювання.

- Перевірте свій статус вакцинації та статус вашої дитини. За бельгійським графіком вакцинації, перша доза вводиться у віці 12 місяців, а друга - між 7 та 9 роками.
- Люди, які вже перехворіли на кір (значна частина населення, народженого до 1970 року) або які вже отримали дві дози вакцини, захищені і не потребують вакцинації.
- Люди, народжені між 1970 і 1985 роками, мають високу ймовірність бути недостатньо захищеними, оскільки вони могли отримати лише одну дозу вакцини.
- Якщо у вас є сумніви, зверніться до вашого лікаря загальної практики або педіатра і візьміть свої записи про вакцинацію, щоб перевірити статус вакцинації вашої сім'ї.



Де отримати вакцинацію?

- Для дітей - у лікаря загальної практики, у педіатра, на консультації для немовлят, організованій ONE або Kind en Gezin, або в PSE чи CLB. Вакцинація є безкоштовною.
- Для дорослих - зверніться до свого лікаря загальної практики.

! Для неімунізованих осіб вакцинація протягом 72 годин після контакту із захворюванням захищає від зараження або розвитку хвороби.